

1.3.1	Ambroxol hydrochloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	BG

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Солволан® 30 mg таблетки  
Амброксол  
Solvolan® 30 mg tablets  
Ambroxol

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Солволан и за какво се използва
2. Преди да приемете Солволан
3. Как да приемате Солволан
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Солволан
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рез. №	200 20 944
Разрешение №	15576 / 01.11.2011
Содбрение №	/

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЛВОЛАН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Солволан намалява жилавостта и гъстотата на бронхиалната лигавица, улеснява отхрачването, облекчава затрудненото дишане, потиска кашличния рефлекс и повишава устойчивостта към респираторни инфекции.

Лекарственият продукт се използва за лечение на остри и хронични респираторни заболявания, придружени от кашлица и отхрачването на гъсти (вискозни) храчки.


### 2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ СОЛВОЛАН

**Не приемайте Солволан**

- ако сте алергичен (свръхчувствителни) към амброксол или към някое от помощните вещества на лекарствения продукт
- ако имате тежко чернодробно или бъбречно увреждане

**Обърнете специално внимание при употребата на Солволан**

По време на лечение със Солволан пийте повече течности отколкото обикновено.



1.3.1	Ambroxol hydrochloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	BG

Пациентите със стомашна язва трябва да бъдат внимателно проследявани.

Ако възникнат някакви лезии по кожата или лигавиците по време на прием на Солволан, той трябва незабавно да бъде спрял. В такъв случай се свържете с Вашия лекар веднага!  
Ако имате бъбречно увреждане или тежко чернодробно заболяване трябва да обърнете особено внимание при използването на Солволан. Трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете да приемате Солволан.

#### **Прием на други лекарства**

Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Няма съобщения за неблагоприятни взаимодействия с други лекарства.

Вие можете да приемате Солволан едновременно с други лекарства за лечение на респираторни и сърдечни заболявания и с антибиотици.

#### **Прием на Солволан с храна и напитки**

Приемайте лекарственият продукт след хранене.

#### **Бременност и кърмене**

*Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приемането на какъвто и да било лекарствен продукт.*

Независимо, че няма доказателства, че Солволан има увреждащ ефект върху плода, риск не може да бъде изключен. Затова той не се препоръчва през първите три месеца от бременността, след това може да се приема само по изрична преценка на лекаря.

Тъй като активното вещество в Солволан преминава в майчината кърма, приложението му по време на кърмене не се препоръчва.

#### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Не е известно Солволан да влияе върху способността на пациентите да шофират или работят с машини.

#### **Важна информация относно някои от съставките на Солволан**

Таблетките Солволан съдържат лактоза. Ако Вашия лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемате това лекарство.


### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СОЛВОЛАН**

Винаги приемайте Солволан точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Дозировка и начин на приложение**

Солволан таблетки е предназначен за лечение на възрастни и деца над 14 годишна възраст. Обичайната доза на таблетките Солвалан при възрастни и деца над 14 годишна възраст е по 1 таблетка три пъти дневно. В случай на продължително лечение (повече от 10 дни), пациентът трябва да приема по 1 таблетка 2 пъти дневно. Приемайте таблетките след хранене, с течност.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Солволан**



1.3.1	Ambroxol hydrochloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	BG

*Ако приемете по-висока доза от лекарствения продукт, или дадете на детето си такава, отколкото би трябвало, трябва да се консултирате с Вашия лекар незабавно!*

**Ако сте пропуснали да приемете Солволан**

*Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропусната доза!*

*Вземете следващата доза в обичайното време.*

**Ако спрете приема на Солволан**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Солволан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата се определя като следва:

- много чести ( $\geq 1/10$ ),
- чести ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ),
- нечести ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ),
- редки ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ),
- много редки ( $< 1/10000$ ) или
- с неизвестна честота (не може да се прецени от наличните данни).

*Чести:* главоболие, гадене.

*Нечести:* повръщане, диария, диспепсия и коремни болки.

*Редки:* сухота в лигавицата на дихателните пътища, секреция от носа, сухота в устата, саливация, запек, обриви, уртикария, дизурия (промяна на вкуса).

*Много редки:* умора.

*С неизвестна честота:* ангиоедем, сърбеж, анафилактични реакции, включително анафилактичен шок, свръхчувствителност и други.


*Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

**5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СОЛВОЛАН**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Солволан след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25 C.°



1.3.1	Ambroxol hydrochloride
SPC, Labeling and Package Leaflet	BG

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите лекарства, които вече не са ви необходими. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### Какво съдържа Солволан

- Активното вещество е амброксолов хидрохлорид (ambroxol hydrochloride).  
Всяка таблетка съдържа 30 mg амброксолов хидрохлорид, което се равнява на 27,36 mg амброксол.
- Другите съставки на таблетките са лактоза монохидрат, целулоза микрокристална, царевично нишесте, повидон и магнезиев стеарат.

### Как изглежда Солволан и какво съдържа опаковката

Таблетките са бели, кръгли, леко двойноизпъкнали, с делителна черта от едната страна. делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно поглъщане, а не да разделя на равни дози.

### Солволан се предлага в кутии:

- От 20 таблетки в блистери, а един блистер опаковка съдържа 10 таблетки.

### Лекарствена информация

Без лекарско предписание

### Притежател на разрешението за употреба и производител

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

### Дата на последно одобрение на листовката

